

嬰

童

百

問

嬰童百問卷之三

天鈞內鈞

第二十一問○
天鈞陽內鈞陰

天鈞者壯熱驚悸眼目翻騰手足抽掣或啼或笑喜
怒不常甚者爪甲皆青如祟之狀蓋由乳母酒肉過
度煩毒之氣入乳乳兒遂使心肺生熱痰鬱氣滯加
之外挾風邪致有此耳治法解利風熱則愈又有內
鈞者腹痛多啼唇黑囊腫偏僂反張眼內有紅筋斑
血蓋寒氣壅結兼驚風而得之經云內鈞胸高時復
漸安眼尾紅脉見是也此乃胎中有風有驚故有此

證先是內臟抽掣極痛狂叫或泄瀉縮脚忍疼啼叫
內證一過外證抽掣又來內外交攻極難調理却要
分作兩項下藥內證服聚寶丸釣藤膏魏香散外掣
服釣藤飲保命丹最要進得乳可以加得小兒受此
病間有好者楊氏乳香丸木香丸皆要藥也

聚寶丸

人參

扶神

琥珀

天麻

直僵蠶

炒

金蠟

炙

朱砂

防風

天南星

烏蛇肉

酒浸一晝
夜晒乾

白附子

生各

麝香

少許

右爲末煉蜜丸如桐子大每服一九菖蒲湯下

蟬蜋散

全蜋

七個去尾

蟬退

二十個

甘艸

二錢半炙

南星

一個泡

右剉散每服二錢水一盞煎五分不拘時候服

神寶既濟丹

詳第十六問

硫黃

銻汁冷用

煖硝

銻汁冷用

五靈脂

青皮

陳皮

半夏麴

各等分

右爲末粟米糊丸麻子大每服三九米飲送下

釣藤膏

治小兒腹中極痛乾嘔後軀名盤腸內釣

乳香

沒藥

木香

薑黃

各一錢

木鼈子

去油
三個

右爲末蜜丸芡實大釣藤湯磨半丸入蜜服先
用此藥定痛後服魏香散

魏香散

蓬朮

五錢

阿魏

二錢

右先將溫酒化阿魏浸蓬朮一晝夜焙乾爲末

紫蘇米飲調下

釣藤飲

治小兒夜啼乃臟冷也陰盛於夜則冷動冷動則爲陰極發躁寒盛作疼所以夜啼不歇也釣藤散主之治驚啼加蟬退防風天麻煎十六間有釣藤散又二十間蟬蛻釣藤飲可兼看

釣藤勾

茯神

茯苓

川芎

當歸

木香

甘州

白芍藥

各一錢

右爲末每服一錢薑棗略煎服其或心熱而煩

啼必有臉紅舌白小便赤澀之症釣藤飲去木
香加朱砂末一錢研和每服一錢木通湯調下
或剉散煎服亦可

保命丸

治小兒胎驚內釣腹肚緊硬眠睡不安夜多啼
哭及治急慢驚風眼目上視手足抽掣不省人
事悉皆主之冷症用此

全蝎

十四个
去毒

防風

二錢

僵蠶

炒去
絲嘴

天麻

各二錢

南星

炮

白附子

麝香

五分

金箔

十片

蟬蛻

朱砂

各一錢

有熱症加牛黃片腦礪砂

右爲末。粳米糊丸。每兩作四十九丸。常服鎮心安神。化痰除一切驚風諸症。湯臨時換一方加入參白茯苓二錢

乳香丸

治驚風內釣腹痛驚啼

乳香

半錢

沒藥

沉香

各一錢

蝎梢

十四個

雞心檳榔

半錢

右爲末煉蜜丸如桐子大每服二丸菖蒲釣藤湯下

木香丸

乳香

沒藥

全蝎

各半錢

釣藤

舶上茴香

木香

各一錢

右先將乳香沒藥另研次入諸藥末和畢取大蒜少許研細和丸桐子大每服二丸釣藤湯下

盤腸氣 第二十二問

盤腸氣者痛則腰曲乾嘔衄上有汗是小腸為冷氣
所搏然耳其口閉脚冷上唇乾是也此是生下洗遲
感受風冷或青糞不實却有此症當服釣藤膏魏香
散蘇合香丸當歸散乳母服烏沉湯或沉香降氣湯
便定

釣藤膏 詳二十一問

釣藤勾

茯神

茯苓

川芎

當歸

木香

甘州

白芍藥

各一錢

右爲末每服一錢薑棗煎服

魏香散

蓬朮

五錢

阿魏

二錢

右先將溫酒化阿魏浸蓬朮一晝夜焙乾爲末

紫蘇米飲調下

蘇合香丸

治傳屍骨蒸殭殍肺痿疰忤鬼氣卒小痛霍亂

吐利時氣瘴瘧赤白暴利瘀血月閉瘰癧下腫

驚癇惡忤中人小兒吐利

蘇合油

入安息膏內

黃陸香

別名龍腦一兩

木香

白朮

白檀香

丁香

朱砂

研水飛

沉香

香附子

炒烏犀屑

蘇發

安息膏

別為末用無灰酒一升煮膏

麝香

研

訶黎勒

煨取皮各二兩

右為細末

入研藥勻用安息香膏并煉白蜜和

劑每服旋丸如梧桐子大早朝井花水溫冷任

意化服四九老人小兒服一九溫酒化下亦得

竝空心服用蠟紙裹一丸如彈子大緋絹袋盛

當心帶之一切邪神不敢近去龍腦名麝香蘇
合丸治一切邪神胸膈噎塞腸中虛鳴宿飲不
消餘症並同

當歸散

治小兒夜啼者臟寒而腸痛也面青手冷不吮
乳是也宜用此方

當歸去蘆 白芍藥 人參各二錢半 甘艸炙

桔梗 橘皮去白各一錢

右為末水煎半盞時時少與服又有熱痛不

叫不止夜發面赤唇焦小便黃赤與三黃丸人

參湯下

烏沉湯

治慢驚祛風助胃

天麻

二錢

人參

真川烏

生用

木香

全蝎

焙

南星

炮

沈香

各一錢

甘艸

半錢

右剉散每服二錢薑三片慢火煎取其半用之

沉香降氣湯

治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞塞心腹脹滿喘

促短氣乾噦煩滿咳嗽痰涎口中無味嗜臥不

安減食

香附子

二兩半
炒去毛

沉香

一錢

砂仁

三錢

甘州

七錢
半

右爲末每服一錢入鹽少許沸湯點之清晨霧露空心服之去邪惡氣使無瘴疫

胎驚風 第二十三

胎驚風者以胎婦調適乖常飲酒嗜欲忿怒驚撲有所觸胎必感之或外挾風邪有傷于胎故子乘母氣生下卽發也其候月內溫壯翻眼握拳噤口身腰強直涎潮嘔吐搐掣驚怖啼哭腮縮顙開眼合莫誤作慢脾妄用溫藥視其眉間氣色紅赤鮮碧者可治若色黯青黑者不治虎口指紋曲入裏者可治反出引者不治其治法解散風邪利驚化涎調氣貼顙甚則以朱銀丸利之面青拳搐者當服保命丹鈞藤散

全蝎散

朱銀九

治臍風壯熱痰盛翻眼口噤取下胎中蘊受之毒亦治驚積但量情用之一方無積字

水銀

一錢蒸棗子肉研如泥

白附子

一錢半

全蝎

一錢南星一錢

朱砂

一錢

天漿子

去殼一錢

牛黃

一錢二分

蘆薈

一錢二分

片腦

一字

鉛霜

半錢和銀研

麝香

半錢

直殭蠶

炒七箇

右爲末粟米糊丸芥子大每服一九薄荷湯

如未通利加至二三九

至聖保命丹

治小兒胎驚內釣腹肚緊硬眠睡不安夜多啼哭及治急慢驚風眼目上視手足抽掣不省人事悉皆主之冷症用此

全蝎 十四个

防風 二錢 殭蠶 炒去絲

天麻 二錢 南星 炮二錢 白附子 二錢 麝香 五分

金箔 十片 蟬蛻 一錢 朱砂 一錢

有熱症加牛黃腦子研砂

右爲末，梗米糊丸，每兩作四十九丸，常服鎮心安神，化痰除一切驚風諸症。湯臨時換一方，加入參、白茯苓二錢。

釣藤散

治吐利脾胃氣虛，生風慢驚。後二十問有蠲是釣藤，飲又二十一問有釣藤，飲可兼看對症。

釣藤勾三錢 蟬蛻 天麻 防風

蝎尾 人參各半兩 麻黃去

甘艸炙 川芎各半錢 麝香不拘

右劉散白水煎寒多加附子末半錢

全蝎散

治方傳度驚

全蝎

七個去尾

蟬退

二十個

甘州

二錢半炙

南星

一個炮

右劉散每服二錢水一盞煎五分不拘時溫服

抱龍丸

治小兒諸驚

抱龍之義抱者保也龍者肝也肝應東方青龍木木生火謂生我者父母也肝為母心為子母安則子安况心藏神肝藏魂神魂既定驚從何生故曰抱龍丸理嬰孩諸驚四時瘟疫邪熱致

煩燥不寧痰嗽氣急瘡疹欲出發搖並宜投服
其藥性溫平不慳不燥常服驅風化痰鎮心
熱和脾胃益精神

琥珀

人參

天竺黃

檀香

白茯苓

各七錢

甘艸

炙一兩半

枳殼

麩炒五錢

枳殼

麩炒五錢

辰砂

水飛二兩

山藥

半斤炒

膽星

炒一錢

金箔

五十片

右爲末蜜九芡實大每服一九薄荷湯下

胎風遍身軟 第二十四回

此症生下如湯火潑因胎熱母肥如腦額生瘡難治
乃胎內失于扶持如脚上有瘡爛此兒不滿五年如
未滿臘前便撮口兩拳相握腰項如隨便知臟腑中
生邪毒此只三朝定不可療男指向裏女指向外皆
可醫治逆候則不須投藥餌矣更看眉中有青筋碧
色應須有命若眉紅斷不可治如有可治之症但用
全蝎散釣藤散等劑

釣藤散

治吐利脾胃氣虛生風慢驚後二十問有蟬退
釣藤飲又二十一問有釣藤飲可兼看對症用。

釣藤勾

三錢

蟬蛻

天麻

防風

蝎尾

人參

各半兩

麻黃

去節

僵蠶

炒

甘艸

炙

川芎

各二錢半

麝香

不拘多少

右剉散白氷煎寒多加附子末半錢

全蝎散

治諸癰胎癰

全蝎

一個

琥珀

硃砂

各少許

右爲末每服一錢麥門冬煎湯調下。

又方

亦名全蝎散治急
慢風大能定搐

全蝎

大者七个薄苛葉
包炙黃色為度

殭蠶

三个炒

辰砂

麝香

各少許

右為末石榴皮煎湯下直指用蟬蛻甘艸南星

醉紅散

治小兒急慢驚風涎潮搐盛口眼偏斜諸惡症

天南星

大者一个酒浸淫
紙裏煨熟焙乾

蜈蚣

一條酒炙

白殭蠶

七條炒
去絲嘴

全蝎

七个去毒

天仙子

一字

朱砂

一錢別研

紫苑

一錢

杏仁

一錢

龍骨

一錢煨

防風

一錢

龍膽艸

錢一

蟬蛻

一錢

百合

一錢

牛黃

別研一錢

白芷

一錢

麝香

一錢

升麻

三錢

大黃

煨四錢

乳酥

一兩

白蜜

三兩

右件藥先以牛黃麝香朱砂各研爲末除酥蜜

外十五味搗爲粗末用水一升入銀鍋內煎至

三合以新綿濾去滓却入鍋內入牛黃麝香朱

砂末及酥蜜等以柳篋不住手攪慢火熬如稠

錫方止封固瓷瓶內聽用周歲兒每服一錢

大沸湯化下日二三服量兒入小兒服

項軟 第二十五問

項軟者乃天柱骨倒也極難調治其患不在心脾此因曾吐瀉之後亦傷寒無汗失表而然本非久病疰羸四肢不收卒然而成此疾項軟頭似石面紅唇赤只因肝膽有熱致令項軟肝受熱風者速與祛風退熱風者然後用強筋之劑貼項立見安和如此症若生下便如此乃胎氣不足或驚風後得此乃是寬緩不收名曰五軟果難得藥胎風并病後軟可服錢氏地黃丸補腎若辛暴如此者只是肝經有熱當服瀉

肝丸貼項當用附子南星末以生薑自然汁調貼項上可也。

瀉肝丸

治肝熱生風眼目上視搖擗急驚可服亦退熱疎風又名瀉青丸

當歸

龍膽艸

川芎

梔子仁

大黃

煨

羌活

防風

各等分

右爲末煉蜜丸如芡實大朱妙竹葉湯化下

地黃丸

治腎痹卽急痹腦熱肌削予足如冰滑洩腹

熟地黃

山茱萸

去核

乾山藥

各四錢

澤瀉

牡丹皮

白茯苓

去皮各三錢

右爲末煉蜜和丸如梧桐子大三歲以下一二
丸至三丸溫水空心化下行遲鶴膝加鹿茸牛
膝五加皮

五軟

第二十六問

五軟者頭軟項軟手軟脚軟肌肉軟是也。無故不舉頭腎疳之病。項脉軟而難收。治雖腎瘡。他年必再發。手軟則手垂。四肢無力。亦懶擡眉。若得聲聞。還進飲食。乃慢脾風候也。尚堪醫治。肌肉軟則肉少皮寬。自離。弊食不長肌肉。可服錢氏極連丸。莫教瀉利頻併。却難治療。脚軟者。五歲兒不能行。虛羸脚軟細小。不妨築衛。但服參芪藥等味。併服錢氏地黃丸。長大自然肌肉充滿。又有口軟則虛舌出口。陽盛更須隄防。

必須治服却無妨唇青氣喘則難調治也

橘連丹

治疳瘦久服消食和氣長肌肉

陳橘皮

一兩

黃連

一兩

去鬚米泔浸一日

右爲細末別研入麝香五分用猪膽七箇分藥入膽內漿水煮候臨熟以針微割破以熟爲度取出以粟米粥和丸如菜豆大每服至二三十丸米飲下量大小與之無時

地黃丸

方見前廿五問項軟條下

五硬 第二十七問

五硬則仰頭取氣難以動搖氣壅疼痛連胸膈間脚
手心如冰冷而硬比爲風症難治肚大青筋急而不
寬川去積之劑積氣消卽安恐而青心腹硬者此症
性命難保如風症只依中風治之必有回生之理小
續命湯加減治之尤良羌活散等劑皆可用

小續命湯

治中風不省人事涎鳴反張失音厥冷

麻黃

去節

人參

黃芩

川芎

芍藥

甘艸

杏仁

去皮尖炒

漢防已

官桂

各一兩半

防風

七錢半

附子

炮去皮臍七錢半

右除附子杏仁外並搗為粗末次入二味夾和

每一錢薑棗煎食前服有熱去附子官桂減半

羌活散

治傷寒驚熱或中風體硬不可加麻黃乾葛米仁

川羌活

川獨活

前胡

柴胡

川芎

白茯苓

桔梗

枳殼

人參

地骨皮

天麻

各等分

甘艸

減半水煎

風症風熱

第二十八問

小兒中風者以其血氣未定寒溫失調內則盛熱蘊蓄外則腠理開虛故風邪乘其外虛而暴中之其狀昏不知人壯熱狂躁搐掣氣粗口噤涎潮是也心中風則偃臥不能傾側發熱失音其舌焦赤若汗流唇赤者可治灸心俞或唇間白黑青黃乃心壞爲水或面目青黑時時竦動者並不治肝中風則踞坐不得低頭左脇疼痛諸筋攣急頭目轉動上視多怒其目青若連兩目連額微青唇青面黃者可治灸肝俞大

段青黑其目一黃一白不治腎中風則踞坐而浮腰
脊痛引小腹其耳黑若兩脇未有黃色起者可治灸
腎俞或脇間如黃土髮直而齒黃赤者不治肺中風
則偃臥胸滿喘息咳嗽躁悶汗出其鼻白若目下至
鼻四圍及唇口皆白色可治灸肺俞或色帶黃乃肺
壞爲血不治脾中風則踞坐腹滿皮肉瞤動四肢不
收其唇黃若一身通黃口吐鹹涎者可治灸脾俞
手足青而厥冷者不治凡人爲風邪所中皆自足
五臟俞而入風入于頷頰之間則口喎而牙

于喉嚨聲音之間則語不出而失音風與氣搏氣逆
痰隔則喉間如鼾鼾之聲響是風也始入于膚脈次
達于經絡而搏于經脈筋得寒則拘急攣痛得熱則
緩弛不隨風挾寒邪卽攣急也風挾熱氣卽緩弛也
拘攣脈必浮緊緩弛脈必浮洪寒者小續命湯熱者
追風毒剉散之類脈浮者病在表脈實者病在裏脈
促者病在上在表者散之在裏者利之在上者瀉之
若虛而寒者則烏附之類又不可缺古人治法雖以
灼艾之類爲本亦當消息權度而投劑焉雖然風寒

暑溼皆能中人。況又有因氣而中風者。人之驟病。莫
急于中風。倉卒之際。若未能精審。且與下氣豁痰。益
中風皆因痰鬱氣滯而作。先用通關散以疏之。急以
南星生薑木香煎湯調蘇合香丸灌下。牙緊者南星
細辛末入麝香烏梅肉點擦牙。自開進藥之後。痰消
氣下。病勢稍蘇。卽詳審五臟外症而調理之。宜省風
湯羌活散。勢甚者防風通聖散。化風丹。牛黃散。釣藤
散。至寶丹等劑。可選而用之。

通關散

治卒暴中風不省人事牙關緊急藥不得嚥下。

細辛

薄荷

牙消

雄黃

各等分

右爲末每用少許吹入鼻中候嚏然後進藥或用白梅擦牙更以菖蒲末著舌下牙關卽開。

小續命湯

治中風不省人事涎鳴反張失音厥冷。

麻黃

人參

黃芩

川芎

芍藥

杏仁

防己

肉桂

甘草

各半兩

防風

七錢半

附子

炮二錢半

追風毒剉散

治中風內外皆熱

大黃

二錢

郁李仁

炒二錢

桑白皮

炒半兩

檳榔

半兩

防風

半兩

羌活

一兩

右剉散每服二錢黑豆三十粒同煎乳食後服

省風湯

治驚風口噤筋脈攣急抽搐疼痛風盛痰

天南星

生用

防風

各四兩

甘艸

生用二兩

半夏

湯浸一宿二兩

黃芩

去粗皮二兩

右剉散每服二錢生薑一片去滓溫服不拘時

羌活散

治傷風寒驚熱或中風神

川羌活 川獨活 前胡 柴胡

川芎 白茯苓 桔槔 枳殼

人參 地骨皮 天麻 各等分 甘艸 減半

右剉散生薑薄荷煎不拘時服加蟬蛻治驚熱
防風通聖散

治小兒熱甚驚風或斑疹出不快者更熱劇黑
陷將欲死者或風熱瘡疥久不愈者諸般風熱

防風 去蘆半兩 荆芥 二錢半 川芎 半兩 錦紋大黃 半兩

當歸 半兩 薄荷葉 半兩 芍藥 半兩 麻黃 去根節半兩

芒硝

半兩

石膏

一兩

黃芩

一兩

桔梗

一兩

滑石

六兩

甘艸

二兩

白朮

二錢半

山梔子

二錢半

右剉每二錢薑二片。水一盞煎七分不拘時服

化風丹

祛風化痰退熱定搐

羌活

獨活

防風

天麻

瞻星

人參

去蘆

川芎

荊芥

粉艸

全蝎

等分

一方加辰砂麝香

右爲末煉蜜丸如芡實大薄荷湯調下一二丸

釣藤散

治吐利脾胃氣虛生風

釣藤鈎

三錢

蟬蛻

天麻

防風

蝎尾

人參

各半兩

麻黃

去節

白直殭蠶

炒

甘艸

炙

川芎

各二錢半

麝香

不拘多少

右剉散白水煎寒多加附子末半錢

至寶丹

治諸稠急驚心熱卒中客忤不得眠睡煩躁風涎搐搦及傷寒狂語伏熱嘔吐並皆治之

生犀屑

一兩

生瑤瑁屑

一兩

琥珀

研細水飛一兩

雄黃

細研一兩

金箔

五十片一兩半為衣

銀箔

五十片

片腦

研一錢

麝香

研一錢

牛黃

研一錢

安息香

一兩半爲

末以無灰酒濾去沙石
約取一兩慢火熬成膏

右件將生犀瑇瑁屑搗羅爲細末。研入諸藥令調勻。將安息膏以重湯煮化和搜爲劑。如乾卽添入少熟蜜盛磁器中。旋丸如桐子大。二歲兒却服二九。人參湯化下。大小以意加減。又治大人諸卒中不語中惡氣中諸物毒中熱暗風產前後血暈死胎不下。並用童子小便一合生薑搗自然汁三五滴同溫過化下。五丸立效。

痙症 第二十九問

夫發痙之候先傷于風又感寒溼致之此虛極生熱熱極生風之甚者也傷風發熱頭痛汗出又自嘔逆汗之必發痙溼家發汗稍多亦發痙此症項強直腰身反張搖頭瘈瘲口噤不語發熱腹痛不惺惺其狀可畏病在足太陽經剛痙無汗柔痙有汗其面紅眼赤牙緊手張痰涎壅盛昏瞢煩渴小便赤澀先譫語而發者此剛痙也無汗當發汗其大便滑洩不語不渴先手足冷而發者此柔痙也有汗當解並以小

續命湯加減剛症去附子用麻黃柔症用附子去麻
黃大便利厥逆者則以熟附佐之其間一症身體壯
熱譫語口乾手足反微寒大便秘反滑洩此爲剛柔不
分之症無汗葛根湯主之有汗桂枝加葛根湯主之
要知無汗則用麻黃有汗則謹勿用也此古方之所
禁其若痰壅氣盛則南星半夏茯苓以消其痰枳實
陳皮紫蘇以順其氣痰消則風止氣順則神清然後
審其熱之輕重而解利之熱輕者敗毒散熱盛者小
柴胡湯解之壯熱有汗胸滿口禁咬牙而六

是為內實大承氣湯下之後用大柴胡湯解之症最難痊十救其一過三日難治請早圖之

小續命湯 治中風不省人事涎鳴反張失音厥冷

麻黃 人參 黃芩 川芎

芍藥 杏仁 防已 肉桂

甘草 各半兩 防風 七錢半 附子 炮二錢半

右除附子杏仁在外俱為粗末入杏附夾和每

服三錢薑三片棗一枚煎服有熱去附子官桂

減半

葛根湯

治太陽病項強无惡風無汗不惡寒剛症

葛根

四兩

麻黃

三錢

肉桂

一兩

甘草

二兩

芍藥

二兩

右剉每服五錢水一盞半加生薑五片棗子二

枚同煎至一盞去滓服取微汗

桂枝加葛根湯

治明瘕項背強无汗出惡風者

桂枝

芍藥

甘草

各六錢

葛根

二兩

右剉散每服三錢生薑棗子煎服

敗毒散

治傷風溫疫風溼頭目昏眩四肢疼痛憎寒壯
熱項強目睛疼尋常風眩拘倦風痰及寒壅咳
嗽鼻塞聲重竝治之

柴胡

去酒

前胡

川芎

枳殼

炒

羌活

獨活

茯苓

桔梗

人參

各一兩

甘草

半兩

右爲粗末每服二錢生薑薄荷煎加地骨皮天
麻或剉散加蟬蛻防風治驚熱可加芍藥乾葛
黃芩無汗加麻黃

小柴胡湯

治傷寒溫熱病身熱惡風頸項強急胸脇滿痛
 嘔吐噦逆煩渴寒熱往來身面皆黃小便不利
 大便秘澀或過經不解或潮熱不除及瘥後勞
 復發熱疼痛煩熱經血適來適斷寒熱如瘧

人參 去蘆 三錢 甘草 炙 三錢 黃芩 三錢 柴胡 去蘆 八錢

半夏 湯泡七次焙乾 二錢半

右剉散每服二錢水一盞生薑三片棗一枚煎
 去滓溫服不拘時

大柴胡湯

治剛痊胸滿內實。口噤咬牙。大熱發渴。大便秘。

大黃

芒硝

各半兩

厚朴

一兩

枳實

一兩

右剉散。每服三錢。薑三片。水一盞。煎半盞。溫服。

大柴胡湯

治傷寒十餘日。邪氣結在裏。往來寒熱。大便閉。澀腹滿脹痛。譫語。心中痞硬。飲食不下。或不大便五六日。繞臍刺痛。時發煩躁。及汗後如瘧。日晡發熱。兼臟腑實。脉有力者可服。

柴胡

法蘆八錢

黃芩

赤芍藥

各三錢

半夏

湯泡七次切片焙乾一錢半

枳實

去穢麩炒半錢

右剉散薑棗煎加減服之欲下加川大黃三錢

夜啼客忤驚啼 第三十問

夜啼者。臟冷也。陰盛于夜。則冷動。冷動則爲陰極發躁。寒盛作疼。所以夜啼不歇也。釣藤散主之。或心熱煩啼。必有臉紅舌白。小便赤澀之症。釣藤散去當歸木香。加朱砂木通煎湯調下。又有觸犯禁忌而夜啼者。用醋炭熏可服蘇合香丸。客忤者。小兒神氣嫩弱。外邪客氣。獸畜異物暴觸而忤之。其候驚啼口出青黃白沫。水穀鮮雜而色變易。喘息腹痛。反側辨寢狀似驚癇。但眼不止。竄脈來弦急而數。視其口中懸癰。

左右若小有腫核卽以竹針刺潰之或以爪甲摘破亦佳。治法辟邪正氣散驚定心爲上。延久則難爲力也。凡客忤中惡急作醋炭或降真香皂角併用熏之。仍服蘇合香丸卽自痊愈。治驚啼拘哭本事方龍齒散主之。又有花火膏亦卒急可用也。論曰心藏神神安則臟和故小兒晝得精神安而夜得穩睡若心氣不和邪氣乘之則精神不得安定故暴驚而啼叫也安神散等劑治之。又有軀啼之症小兒驚風母將養失宜傷于風冷則邪氣入于胞絡

冷氣停留復因乳哺不節邪氣與正氣相搏故腹痛
軀脹感是氣而啼也牛黃丸等劑主之冷甚者理中
丸主之

釣藤散

治小兒夜啼及臟冷也陰盛于夜則冷動冷動
則爲陰極發躁寒盛作疼所以夜啼不歇也釣
藤散主之治驚啼加蟬蛻防風天麻前十六問
有釣藤散並十問蟬蛻釣藤散其兼看對症用

釣藤散

茯苓

茯苓

川芎

蘇合

香

散

白芍藥

各一錢

右爲末。鋪服十錢。薑棗略煎服。其或心熱而煩。啼必有臉紅舌白。小便赤澀之症。鉤藤飲去木香。加朱砂末一錢。研和。每服一錢。木通湯調下。或剉散煎服亦可。

蘇合香丸

治傳屍骨蒸。淹殍肺痿。疰忤鬼氣。卒心痛。霍亂吐利。時氣瘴癘。赤白暴利。瘀血月閉。瘕瘕。驚癇。鬼忤。中風。小兒吐亂。

蘇合香油

入安香膏內一兩

龍腦

別研一兩

藁陸香

一兩

木香

二兩

白朮

二兩

白檀香

二兩

丁香

二兩

沉香

二兩

香附

炒二兩

烏犀屑

二兩

朱砂

研水飛二兩

華櫟

二兩

麝香

研二兩

安息膏

二兩別為末用無灰酒煮膏

訶梨

勒二兩煨取皮

右為細

不入研藥勻用安息香膏并煉白蜜和

劑每服

旋丸如梧桐子大早朝井花水溫冷任

意化服

四丸溫酒化下亦得並空心服老人小

兒服

禁丸用蠟紙裹一丸如彈子大緋絹袋

當心藥之出切邪神不敢近去龍腦名麝香蘇
合丸治一切邪神胸膈噎塞腸中虛鳴宿飲不
消

龍齒散

治小兒哭肚痛驚熱

龍齒

蟬蛻

釣藤

羌活

茯苓

人參

各等分

右剉散每二錢薑棗煎服

碧霞散

治小兒汗身壯熱夜啼

栝菜

半兩

南星

殭蠶

全蝎

鬱金

雄黃

各一錢

石爲末和勻。每服一錢。用薄荷蜜水調下。

六神散

治腹痛啼哭。面青口中冷氣。四肢亦冷。曲腰而啼。或大便泄瀉。及不吮乳。

人參

山藥

白朮

各半兩

甘艸

二錢

白茯苓

白扁豆

炒各一兩

右爲末。每服二錢。薑二片。棗一枚。煎服。一方用

當歸。白芍藥。人參。各二錢半。甘艸。桔梗。陳皮。各

一錢為散每服二錢水煎時時服

花火膏 治夜啼脾臟冷而痛

燈花 一顆百一選加礪砂一字末砂蜜調成膏子

右取塗乳上令兒吮乳

牛黃丸 治風癇迷悶搐掣涎潮

膽星 焙 全蝎 焙 蟬蛻 各二錢半 防風

白附子 生 天麻 直僵蠶 炒各二錢半

麝 半錢

右為末以煮棗去皮核取肉和水銀半錢研

細入藥末。九如菰豆大。每服一丸。荆芥生薑湯送下。

理中丸

人參

白朮

乾薑

炮各三兩 甘草 炒減半

右爲末。蜜丸。雞子黃大。每服一丸。白湯化下。

安神散

治嬰孩夜啼

蟬蛻

四十九个。只用後一截。除去前一截。併嘴脚。

右爲極細末。作四服。用釣藤湯調下。不拘時服。

金箔鎖心丹

安神。小兒夜啼。

全蝎

七个用薄荷包慢火上炙乾

天麻

煨

防風

去蘆

羌活

去蘆

牛黃

赤茯苓

去皮

犀角

甘艸

炙各二錢

辰砂

一錢水飛

麝香

半錢

金箔

二十片

右爲細末煉白蜜丸如皂角子大薄荷煎湯不

拘時服

要旨問卷之四

治疾 第三十一問

胎疾謂月數將滿母失調護或勞動氣血相干或坐卧飢飽相役或飲酒食肉冷熱相制或恐驚血脈相傷胎氣有傷兒形無補有胎熱胎寒胎黃胎肥胎弱等症胎熱則兒在胎中母多驚悸或因食熱毒之物既生之後兒多虛痰氣急喘滿眼目眵泪神困呵欠反側伸舒呃呃作聲大小便不利或通利卽有血水瘰癧手常拳緊脚常搐縮眼常邪視身常掣跳皆由

胎中受熱宜速與太連翹飲子解散諸熱次與消風散數服無恙其胎驚胎風自見本症茲不贅述胎寒則兒在胎中母因感受寒邪或喜食生冷過度寒盛則腸鳴洩利邪氣以亂其真氣治寒邪當用和解治臟寒則溫臟寒甚則有盤腸內釣皆因寒而得之大便青者是也各有本症見之胎黃候則小兒生下遍體面目皆黃狀如金色身上壯熱大便不通小便如梔子汁乳食不思啼叫不止皆因母熱受而傳于胎也凡有此症乳母可服生地黃湯仍忌熱毒之物

肥則生下肌肉厚。遍身色紅。滿月以後。漸漸羸瘦。目
白睛粉紅色。五心煩熱。大便難。時時生涎。浴體法主
之。胎弱則生下面無精光。肌肉薄。大便白水。身無血
色。時時哽氣多噦。目無精采。亦當浴體法治之。凡胎
氣稟賦有壯有弱。其母飲食恣令飢飽。起止無忌。令
兒得疾。不寒卽熱。不虛卽怯。熱乃作壅寒乃作洩。虛
則作驚。怯則作結。寒則溫之。熱則涼之。虛則壯榮。怯
則益衛。驚用安神丸。結用微利。詳審用之。可保無虞。
不若古人胎教之法。決無諸症。生子必形容端正。爲

世之英傑也

大連翹飲

治瘡疹壯熱小便不通諸般瘡癰丹毒臍風

連翹

瞿麥

荊芥

木通

當歸

防風

赤芍藥

柴胡

滑石

蟬蛻

甘艸

炙各一錢

山梔仁

黃芩

各五分

右剉每服二錢加紫艸煎溫服熱甚加大黃

消風散

治諸風上攻頭目昏痛項背拘急肢體煩燥
肉蠕動目眩旋暈耳作蟬鳴眼澀好睡鼻塞多
嚏皮膚頑麻瘙瘡癰疹小兒虛風目澀昏困

白茯苓

去土

芎藭

羌活

去蘆

荆芥穗

防風

去蘆

藿香葉

蟬蛻

去上

白僵蠶

炒去絲嘴

甘艸

判炙

陳皮

去白

厚朴

去皮薑汁製各三兩半

右爲細末每服半錢余清調下薄荷湯亦可又

治急慢驚風用乳香荆芥湯調下或加雄黃名

雄風散

生地黃湯

治小兒生下遍體面目皆黃狀如金色身上壯熱大便不通小便如梔子汁乳食不思啼叫不止此胎黃之候皆因母受熱邪而傳于胎也凡有此症乳母宜服仍忌酒麪五辛之物

生地黃

赤芍藥

川芎

當歸

酒洗

右剉散每服五錢水一盞煎至六分去滓產後亦可服抹此少入兒口中

天麻 二錢

蝎尾 五分

下砂 五分

青黛 三錢

烏梢蛇肉

酒浸焙 三錢

白礬

二錢

麝香

一字

右同研勻。每用三錢水三升。桃枝一握。葉五七枝。同煎至一沸。溫熱浴之。勿浴背。

之亦良法也。栢子仁散三辛散等劑。傳之尤妙。

脾頤 第三十二問

仲陽論解頤生下而頤不合腎氣不成也。張必少笑。
張氏曰：白睛多，眇白身瘦者，多愁少喜也。餘見腎虛。
國楊氏曰：小兒年大，頭縫開解而不合者，腎主髓腦。
生時腎氣有虧，腦髓不足，所以頭頤開而不能合。
人無之，腦髓如木無根，凡得此者，不遠千日。其間亦
至幾歲，乃成廢人。設有此症，不可束手待斃，宜與錢
氏地黃丸，仍用南星微炮爲末，米醋調敷于緋帛烘
乾之，亦良法也。栢子仁散三辛散等劑，傳之尤妙。

桐子仁散

治小兒驚風不令

防風 桐子仁等分爲末。乳汁調塗顙門上。

地黃丸

熟地黃

山茱萸

去核

乾山藥

各四錢

澤瀉

牡丹皮

白茯苓

去皮各三錢

右爲末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三九溫湯下。

二辛散

一名封顙散一名桂號散治嬰孩小兒腦顙大開

細辛

桂心

各半兩

乾薑

錢

右爲末。乳汁調塗顙上。乾時再塗。面赤爲效。

顛陷顛填

第三十二問

顛陷者。始因臟腑有熱。渴飲水漿。致成洩利。久則血氣虛弱。不能上充腦髓。故顛陷如坑。不能平滿。川狗頭骨炙黃爲末。雞子清調傅之。顛填者。顛門腫起也。脾主肌肉。乳哺不常。飢飽無度。或寒或熱。乘于脾家。致使臟腑不調。其氣上衝。爲之填脹。顛突而高如物堆起。毛髮短黃。自汗是也。若寒氣上衝。則牢斬熱氣上衝。則柔軟。寒者溫之。熱者涼之。劑量輕重。兼與調氣。小兒肝盛風熱。反攻亦然。此症未易退差。或熱症。

大連翹散以消之有表熱症柴胡散主之又有封
固散掩之論曰小兒胃氣冲和則腦髓充盛顛頂漸
平胃氣熱薰蒸臟腑則渴而引飲因致洩利令臟
經寒熱血氣虛弱不能上充腦髓所以顛陷也聖濟
總微當歸散地黃丸

大連翹飲 治瘡疹壯熱小便不通
諸般瘡毒丹毒癰風

連翹

瞿麥

荊芥

木通

當歸

防風

赤芍藥

柴胡

滑石

蟬蛻

甘艸

炙各錢 山梔仁

黃芩 各五分

市劉每服二錢紫草煎溫服熱甚加大黃五分

樂胡散 治小兒傷寒無汗有表症壯熱頭疼身腫
痛口乾煩渴小便赤大便秘澀火驚嘔

石膏 黃芩 甘艸 赤芍藥

葛根 各二錢半 麻黃 去節 柴胡 半兩

右劉散三歲兒每服二錢水一盞生薑一片葱

白三寸煎半盞不拘時服

封額散 治小兒腦角骨大顛開不合

細辛 桂心 各半兩 乾薑 一錢

右爲末。乳汁調塗顙上。乾時再塗。面赤爲效。

地黃丸

治腎疝。腦熱。肌削。手足如水。滑洩。肚痛。

熟地黃

山茱萸

肉乾山藥

各四錢

澤瀉

牡丹皮

白茯苓

去皮各三錢

右爲末。煉蜜丸如梧子大。每用白湯送下三九。

當歸散

治小兒顙門陷下

甘艸

炙半錢

桔梗

陳皮

當歸

各錢

右到水一盞煎六分服不拘時候。

目內症

第三十四問

目內赤者心熱導赤散主之。淡紅者心虛熱生犀散主之。清肝熱瀉青丸主之。淺淡者補之。黃者脾熱瀉黃散主之。無精光者腎虛地黃丸主之。龍木論小兒以關睛候皆因失誤築打損着頭面額角兼倒撲。今兒肝受驚風遂使兩眼關睛宜服牛黃丸。口譏血眼宜服生熟地黃散。流行血氣熱毒服小防風湯。風毒服小流氣飲。積毒服小菊花膏主之。斑瘡入眼。決明散。蜜蒙花散主之。又有犀角散石楠散通頂爲妙。或

偏後眼如土膜或痘疹入腹眼不能開及諸症眼定

無精光難治

導赤散 治心驚內虛邪熱

生地黃 生甘艸 木通 各等分

石劉散竹葉煎加黃芩赤芍藥羌活燈心煎

驚風丸 治小兒赤眼多泪睛疼心躁并消熱驚急驚發搐等症

當歸 川芎 防風 膽草

大黃 羌活 山梔仁 各等分一方用甘草赤芍藥

為末煉蜜丸如芡實大每服一九沙糖湯下

生犀散

治目內淡紅者心虛熱

生犀

錢二

地骨皮

赤芍藥

柴胡

乾葛

各一兩

甘艸

半兩

右剉每服二錢水一盞煎至七分濾去滓溫服

瀉黃散

淺淡者補之黃者脾熱

藿香葉

七錢

山梔仁

一兩

石膏

五錢

甘艸

五錢

防風

四兩去蘆

右剉散同蜜酒微炒每服二錢水煎服不拘時

地黃丸

熟地黃

山茱萸

肉

乾山藥

錢

各四

澤瀉

牡丹皮

白茯苓

去皮

各三錢

右爲末。煉蜜丸如桐子大。每用溫湯送下三九。

土熟地黃散

治小兒疳蝕眼患。閉合不開。羞明怕日及內障。

生地黃

洗

熟地黃

洗

麥門冬

去心

各一錢

川當歸

枳殼

燒炒

甘艸

炙

防風

杏仁

湯泡

去皮

尖炒赤

赤芍藥

各半

兩

右剉每服一錢。黑豆七粒煎豆熟爲度。去滓服。

地黃散

治小兒心肝蘊熱目赤腫疼內生赤脈或白膜遮睛四邊散漫者猶易治若暴遮黑睛多致失明宜速用此方亦治瘡疹入眼

生地黃

熟地黃

蟬蛻

去頭足

木賊艸

穀精艸

生犀末

當歸

各二錢半

防風

去蘆

羌活

白蒺藜

去刺

甘艸

沙苑蒺藜

木通

各一錢半

黃連

去鬚

大黃

各一錢

玄參

半錢

右爲細末每服一字或半錢量大小加減煎羊

肝湯食後調下。日三。忌口將息。亦治大人。

小防風湯 治小兒熱毒眼患

大黃 蒸 山梔子 甘艸 炙 防風

赤芍藥 川當歸 洗 羌活 各等分

右剉。每服二錢水一盞。煎五分。去滓。通口溫服。

流氣飲 治小兒風毒眼患

蟬蛻 去足 甘艸 炙 羌活 天麻

當歸 赤芍藥 防風 大黃

薄荷 杏仁 各等分

右剉散。每服二錢。水煎去滓。食後通口服。

小菊花膏

治小兒積毒眼患

黃連

黃芩

大黃

菊花

羌活

蒼朮

米泔浸

荆芥穗

防風

各等分

右爲細末。蜜九芡實大。每服一九。白滾湯化下。

決明散

治小兒疹痘瘡入眼

天花粉

半兩

決明子

赤芍藥

甘艸

炙各三錢半

右爲細末。每服半錢。蜜水調下。日三。

蜜蒙花散

治小兒疹痘并諸毒入眼

蜜蒙花

錢一

青箱子

決明子

車前子

右末用羊肝一令破開縫三條摻藥令入

以溼紙七重裹炭火中煨熟空心食之

犀角飲

治眼疾

犀角

一兩

射干

龍胆艸

黃芩

釣藤

七錢

人參

二兩

茯苓

甘草

右剉散每服二錢水一盞煎至五分

溫服

牛黃丸

治肝受驚風遂使眼目赤痛

牛黃

白附子

肉桂

全蝎

川芎

石膏

各二錢半

白芷

藿香

各半兩

辰砂

麝香

各少許

石為細末煉蜜為丸如梧桐子大臨臥時薄荷湯化下三丸乳母忌食辛辣熱物并溼麪等物

耳病 第三十五問

耳者腎之候小兒腎經氣實其熱氣上衝于耳遂使
津液壅滯爲膿爲汁者也亦有澡浴水入耳中水淫
停留擗干而氣醞釀成熱亦令耳膿久而不瘥變而
聾耳龍骨散主之又湯氏有五般停耳候停耳者常
有黃膿出是也膿耳者常有紅膿出是也纏耳者常
有白膿出是也底耳者裏面腥臭囊耳者裏面虛鳴
時出膿然五般病源一也皆由風水入耳內有積
熱之毒而成若不早治久則成聾胭脂膏等治之仍

化痰退熱等劑卽愈

龍骨散

治膿耳

明礬

煨

龍骨

煨各二錢

黃丹

炒一錢半

胭脂

一錢

麝香

一字研

右爲細末。先以綿撚拭去膿汁。次以鷺毛管吹

藥入耳。本方加海螵蛸末尤妙。

龍黃散

治小兒聾耳汁出不止

枯礬

龍骨

煨

黃丹

炒各半兩

麝香

研一錢

右同研細。先以綿杖子撚却耳中膿水。用一字

摻在耳內，但用之，勿令風入。

乾胭脂膏

治小兒聾耳，常出膿水不止。

乾胭脂

白龍骨

白礬

煨

白石脂

研等分

右研如粉，用棗肉和丸，棗核大，以綿裹一丸納耳中，日三換之。

金箔散

枯礬

胭脂

各半兩

金箔

七片

右同研令勻，爲細末，日三四度，摻少許于耳內。

蔓荊子散

治內熱耳出膿汁。

升麻

木通

赤芍藥

桑白皮

生地黃

麥門冬

去心

前胡

甘菊花

赤茯苓

蔓荊子

甘艸

炙各等分

右剉散每服三錢薑一片棗二枚水一盞煎六

分食後臨臥服

鼻病

第三十六問○鼻衄者黃芩湯
主之清肺飲子治風與涼膈

凡牙兒三朝五日六晨一臘忽然吻乳鼻塞不能開口呼吸者多是乳母安睡之時鼻中出息吹著兒顙或以水浴洗用水溫冷不避風邪所以致兒鼻塞宜與通關膏傅之消風散服之或有驚悸作熱薄荷散與服生者亦佳又有鼻衄是熱搏于氣而乘于血也肺主一身之皮毛口氣開竅于鼻蘊寒先客皮膚搏于氣而成熱熱乘于血血得熱而妄行從鼻中出者名鼻衄也或未及發汗而鼻燥喘息鼻氣鳴卽衄治

法皆依大方而分劑略輕耳黃芩湯犀角地黃湯三
之生地黃茅根煎服尤佳。

黃芩湯

治下利而頭痛胸滿口苦咽乾或生瘡
熱而嘔其脈浮大而弦者專治協熱下利

黃芩

半一兩

芍藥

一兩

甘草

炙半兩

右咬咀每服三錢棗子一个水一盞煎七

泮溫服嘔者加半夏一兩二錢生薑三

薄荷湯

治乳下嬰兒鼻塞不通及治夾驚

薄荷葉

半兩

羌活

全蝎

甘草

麻黃

去節

僵蠶

炒去絲嘴

大竺黃

白明

右爲末。薄荷湯下。熱極生風。加竹瀝少許。與服。
一方有柴胡。白芍。桔梗。茯苓。無全蝎。僵蠶。天竺。
黃白附子。

消風散

治諸風上攻。頭目昏痛。項背拘急。肢體煩疼。肌
肉蠕動。目眩。旋暈。耳作蟬鳴。眼澀。好睡。鼻塞多
嚏。皮膚頑麻。瘙癢。癰疹。小兒虛風。目澀昏困。

白茯苓

去皮
一兩

川芎

一兩

羌活

去蘆
一兩

荆芥穗

一兩

防風

去蘆
一兩

藿香葉

一兩

白殭蠶

炒
一兩

蟬蛻

去土 一兩

甘草

炙一兩

厚朴

薑炒一兩

陳皮

去白 一兩

石為細末每服半錢茶清調下。

經方

風搖擗關竅不通皆由痰塞中脘留滯百

餘所以痰之所以潮塞者氣實使之。

白

炮一

麝香

一字

猪牙皂角

略燒存性二錢

赤

炙一

直僵蠶

炒去絲一錢

右為末以十點薑汁蘸藥少許擦牙或用物引

出白開十九問開牙散通用

口瘡鵝口重勝 第三十七問

備云。鵝口候者。小兒初生。口裏白屑滿口。舌上如鵝之口。故曰鵝口也。此乃胎熱而心脾最盛。薰發于口。趙氏用髮纏指頭蘸井花水揩拭之。睡時以黃丹燻出火氣。摻于舌上。小兒初出腹有連舌。舌下有膜。如石榴子中隔連其舌。下後令兒言語不發。不轉也。可以瓜甲摘斷之。微有血出無害。若血出不止。可作灰末傅之。血便止也。用保命散。枯白礬一錢。麝牙硝半錢。硃砂一分。同研細。取白鵝糞以水攪。

調塗舌上領頰內先用髮纏指揩拭舌上垢了
然後用藥傅之口瘡候乃小兒血氣盛兼將養過溫
心臟積熱薰蒸于上焦故成口瘡也宜用南星末淡
醋調貼兩脚心乳母宜服洗心散却用洗心湯傅口
之法用黃連末以蜜水調抹口中黃蘗青黛冰片皆
可又以牛黃少許末之竹瀝調塗口內治鵝口以馬
牙硝如豆許塗亦好或口如魚口不能合或作鴉聲
者難治又有小兒初生上腭有物脹起如懸癰或如
瘡瘻溢水之狀者名曰重腭此乃脾胃挾熱血氣不

能收欲頷中舌。或在腮頰如吹小脰。速宜以綿纏長針微露鋒銳刺腫處。決出惡汁即消。若再生宜再刺。不爾則脹滿口中。有妨乳食呼吸也。

保命散

治小兒口裏白屑滿舌上如蟬。

枯礬 一錢

牙硝

半兩
細研

朱砂

半

錢

右同研細。每服一字。取白鵝屎以水攪取汁調塗舌上。頷頰內。未用時先以手指纏亂髮拭舌上垢。然後使藥傳之。

吳茱萸散

治初生兒嘴乳後口內即生白屑煩躁。

吳茱萸不拘多少。醋調傅兒脚心內。退卽去之。
心有客熱。口生瘡。以南星末醋調傅脚心。茱萸
散亦治口瘡。卽洗去之。

蓮心散

治風壅壯熱。頭目昏痛。痰涎壅滯。涕唾稠黏。心
神不寧。眼澀睛疼。及鼻塞聲重。咽乾多渴。五心
煩熱。小便黃赤。大便秘澀。並宜服之。

白朮 一錢半 甘艸 炙

當歸

荆芥穗

麻黃

不去節

芍藥

大黃

麩裏煨。切焙。各六錢。

右劉散每服四錢。生薑薄苧湯去滓乳母服或
兒服。加前胡生地黃辰砂名辰砂七寶散爲末
治小兒口瘡積熱夾驚傷寒生薑薄苧調下一
錢。二十問內有七寶洗心散可兼看對症用
辰砂七寶散

治小兒壯熱傷風壅熱治夾驚傷寒解諸般熱
亦治疹痘熱治驚風定搐搦

麻黃

去節

白朮

當歸

大黃

赤芍藥

荊芥

前胡

生地黃

甘艸

各半

右爲末。傷風發散。用生薑薄苽煎。急驚加辰砂。
薄苽調下。兩局方洗心散亦可。

瀉心散

治心中痰氣實則氣行澀。合臥則氣不通。故喜
仰臥則上下通也。用黃連一兩去鬚爲末。每服
半錢。或一錢。臨臥時溫水下。

牛黃散

治小兒疳積重。齕腫痛口中涎出。

牛黃

龍腦

丹砂

各二錢半

鈴霜

半兩

太陰玄精石

一兩

右爲末。每服半錢。先于腫處針破出血。鹽湯拭

口。搽藥在內。

一捻金散

治小兒驚口口瘡

雄黃

三錢

硼砂

一錢

甘艸

半錢

片腦

少許

右爲細末。乾搽患處。或用蜜調塗。

葛氏方

治小兒驚口

黃丹 味炒黑水飛研細搽舌上卽愈。仍服消

毒飲

犀角消毒飲

治嬰孩小兒風毒赤紫丹瘤壯熱狂燥睡臥不安胸膈滿悶咽喉腫痛九道有血妄行遍身丹

毒

牛旁子

炒一兩半

荆芥穗

錢五

甘艸

錢二半

防風

錢二半

犀角

錢一兩半

右剉散用水煎不拘時服

重舌弄舌

第三十八

巢氏云小兒重舌者心脾俱有熱也心候于舌而主血脾之絡脈出于舌下若心脾有熱則血氣俱盛附于舌根重生壅出如舌而短小是也有者頰裏及上腭者名曰重腭著齒齦者曰重齦皆當刺去其血用真蒲黃傅之或髮灰或馬牙硝或硼砂或焰硝傅之或竹瀝浸黃蘗點之亦好又木舌症舌者心之候脾之脈絡于舌也臟腑壅滯心脾積熱熱氣上衝故令舌腫漸漸脹大塞滿口中是爲木舌若不急療必致

害人用朴硝二分紫霜一分白鹽半分同研每半錢
竹瀝并花水調傳不用朴硝及鹽亦可又方用黃葵
花研細黃丹伴之同研點七次又舌脹滿口單用水
片點之亦妙又弄舌者脾臟微熱令舌絡微緊時時
舒舌治之勿用冷藥下之當少與瀉黃散漸服之亦
或飲水醫疑爲熱必冷藥下之非也飲水者脾胃虛
津液少也又加面黃肌瘦五心煩熱卽爲疳瘦宜胡
黃連九輩大病未愈用藥後弄舌者凶又有舌上白
胎并黑色者用礪砂爲末摻之熱甚者加米片或單

用黃丹如豆許以按舌下尤效

馮黃散

藿香葉

七錢

山梔仁

二兩

石膏

五錢

甘艸

五錢

防風

四兩

右剉散同蜜酒微炒香每服二錢水煎服

胡黃連丸

川黃連

半兩

胡黃連

半兩

朱砂

一分

將二連爲細末入朱砂末填入猪膽內用淡水煮以杖子銚子上用綿鈞之勿着底候一炊久

取出研入蘆薈麝香各一分。飯和丸如麻子大。每服五七丸。至一二十丸。食後米飲下。一作食前。治痢症有熱者。

液散

治嬰孩小兒驚口重舌口瘡

青黛 一錢
朴硝 一錢
冰片 少許

右爲細末。蜜調。以驚翎少許傅上。

字散

朱砂冰片各少許。蜜調。驚翎刷口內。嚥下無效。

齒痛 第三十九問

聶氏云稟受腎氣不足者。即體不强。蓋骨之所絡而為髓。髓不足。故不能充于齒。所以齒生遲也。宜用芎藭乾地黃山藥當歸芍藥甘草各等分。研末用熟水調服。或時以藥末擦齒齦。齒即生也。

芎黃散 治齒生遲此方主之

川芎 五錢 山藥 當歸 炒 芍藥 炒

甘草 炙各二錢半

右為細末。用白湯調化。食後服。將乾藥末擦齒。

喉痺腮癰

第四十問

巢氏云。此二症乃風毒之氣客于咽喉與血氣相搏而結腫成毒。熱入于心。卽煩亂不食而死。此候急用金星丸下之。治小兒咽喉腮腫疼痛。當用升麻馬牙硝礪砂牛黃等劑。連翹湯不可缺也。連翹漏蘆湯亦可服。

金星丸

治小兒風熱壅盛。喉中痰鳴。嗽喘氣粗。面頰紅。腮赤腫疼。咽喉壅塞。目閉不開。多眠發熱。狂言。

煩燥多渴則生驚風。大便不通。小便如血。諸般熱壅瘡。癢煩燥。並宜服之。

鬱金

雄黃

各二錢半

膩粉

半錢

巴豆

七粒去油

右爲末。調勻。醋糊爲丸。麻子大。薄荷湯下。

連翹漏蘆湯

治小兒癰瘡。丹毒瘡。癰咽。喉腫。痛腮。腫。

漏蘆

麻黃

去根節

連翹

升麻

黃芩

白欬

各一錢

甘艸

枳殼

各半錢

右爲粗末。每服一錢。以水一小盞煎。

澤量兒大小不拘時溫服熱甚加大

連翹湯

治瘡疹壯熱小便不通諸般瘡癰丹毒臍風

連翹

瞿麥

荊芥

木通

當歸

防風

赤芍藥

柴胡

滑石

蟬蛻

甘艸

炙各一錢

山梔仁

黃芩

各五分

右剉細每服二錢加紫艸煎溫服熱甚加大黃更詳症加減

清涼飲子

治小兒百病。變蒸客忤。驚癇壯熱。痰涎壅盛。煩悶。頰赤。口乾。煩渴。項頸結熱。頭面瘡癰。肚中執痛。更四十四問。有四順清涼飲。可詳症通用。

大黃

連翹

芍藥

羌活

當歸

防風

甘艸

山梔仁

各等分

右剉散。每服二錢。水半盞。煎三分。去滓。不拘時服。